

# 肠胃病应对措施模板

## 背景：

人在使用炭疽污染的食物过后或者吞入炭疽孢子时会感染炭疽病毒。炭疽感染肠道，会引起肿胀和发炎。炭疽热细菌还可以扩散到血液中。在所有类型的炭疽中，胃肠道炭疽是最难诊断的。如果不及时治疗，很有可能会危及生命。约 25%至 60%的病例是致命的。胃肠炭疽很罕见，但在非洲和亚洲已有爆发。大多数情况是因吃未煮熟，被污染的肉食而引起。目前在美国还未有报告的病例。

最初症状:	后期症状:
<ul style="list-style-type: none"><li>• 症状通常出现在接触期七天之内</li><li>• 食欲不振</li><li>• 发烧</li><li>• 检查以下症状：发烧，呕吐，腹泻和脱水</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 腹痛</li><li>• 呕吐（带血丝）</li><li>• 严重腹泻</li><li>• 口腔或咽喉疮疡</li></ul>
<b>治疗：</b>	
<p>胃肠炭疽需用抗生素治疗。抗生素也会有帮助，但只应在保健专业人士推荐后服用。大多数人会使用多西环素（强力霉素）。强力霉素已被证明比其他抗生素造成的副作用要少。如果感染人是孕妇，处于哺乳期，或对强力霉素过敏，他们应使用环丙沙星。环丙沙星可能会导致更多的副作用，但依然可以安全服用。食品和药物管理局（FDA）已经批准了这两种药物。</p>	
<b>如果您吃了被炭疽污染的食品：</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 拜访您的医疗保健专家进行检测和治疗</li><li><input type="checkbox"/> 抗生素有帮助，但只应在保健专业人士推荐后服用</li><li><input type="checkbox"/> 多喝水以取代失去的体液和电解质。</li></ul>	

